



HIMALAYA®

GROEIREGULATOR | RÉGULATEUR DE CROISSANCE

Groeiregulator tegen vroegtijdige spruitvorming in de teelt van aardappelen en uien
Régulateur de croissance contre la formation des germes en cultures de pommes de terre et oignons

Wateroplosbaar granulaat (SG) op basis van 60.6 % maleïnehydrazide

De werkzame stof maleïnehydrazide is aanwezig in de vorm van kaliumzout en de gegarandeerde concentratie wordt uitgedrukt in zuurequivalent.

Granulés solubles dans l'eau (SG) contenant 60.6 % d'hydrazide maléique

La substance active hydrazide maléique est présente sous forme de sel de potassium et la teneur garantie est exprimée en équivalent acide

HIMALAYA®

Toelatingsnummer: 9948P/B

Wateroplosbaar granulaat (SG) op basis van 60.6% maleïnehydrazide.

Gevarenaanduidingen:

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

P280 Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.

Aanvullende informatie

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

SPe3 Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een buff erzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobepalende maatregelen).

HIMALAYA®

Numéro d'autorisation: 9948P/B

Granulés solubles dans l'eau (SG) contenant 60.6% d'hydrazide maléique.

Mentions d'avertissement:

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence:

P280 Porter des gants de protection et des vêtements de protection.

Informations additionnelles:

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).



Verdeeld door | Distribué par :

UPL Benelux B.V.

Claudius Prinsenlaan 144a, 4818 CP Breda, The Netherlands

Tel. +31 (0)85 0712300

Erkend door/Agréé par :

Arysta LifeScience Registrations Great Britain Limited

Brookland Farm, Cheltenham Road, WR11 2LS Evesham, Worcs, UK

Product bestemd voor beroepsgebruik / Produit destiné à un usage professionnel

Toelatingsnummer / Numéro d'autorisation: **9948P/B**

Lotnummer en productiedatum/Numéro de lot et date de production:
zie verpakking/voir emballage

Antigifcentrum / Centre Antipoisons : +32 (0)70 245 245

* Gedeponereerd handelsmerk van/ Marque déposée d'Arysta LifeScience Corporation

INHOUD/CONTENU : 5 KG e
60.6 % MALEÏNEHYDRAZIDE/ HYDRAZIDE MALÉIQUE SG

GEBRUIKSAANWIJZING

HIMALAYA® is een groeiregulator die vroegtijdige spruitvorming bij aardappelen en uien tijdens de opslag tegengaat.

HIMALAYA® blokkeert de mitotische celdeling, maar niet de celgroei en -strekking.

Aardappelen (open lucht)

Tegen vroegtijdige spruitvorming.

Toepassingsstadium: knolvorming (BBCH 4), 80% van de knollen groter dan 25 mm (Optimaal: knollen tussen 25 en 35mm).

Dosis: 5 kg/ha, maximaal 1 toepassing.

Veiligheidstermijn: 35 dagen

Diffirendierende maatregelen: respecteer een minimale buffer zone van 1 m met klassieke techniek.

Opmerkingen:

- Werkingsduur van 3-4 maanden, afhankelijk van de variëteit en de omstandigheden tijdens de opslag.
- HIMALAYA® dient toegepast te worden op een groen en vegetatief gewas (geen droogtestress, ziekten of insecten).
- Om het juiste toepassingsmoment te bepalen, is een knolbemonstering en maatsor- tering op verschillende plaatsen in het perceel noodzakelijk. Knollen met een diameter van 25mm of meer, kunnen verder uitgroeien na een toepassing van HIMALAYA®. Knollen die kleiner zijn dan 25mm op het ogenblik van toepassen, groeien niet meer verder uit. Men moet wachten tot minimaal 80% van de knollen 25mm groot is alvorens te behandelen (Optimaal: knollen tussen 25 en 35mm).
- HIMALAYA® niet toepassen op aardappelen voor de pootgoedproductie.
- Voor een goede opname van het product, moet het 24 uur na de toepassing droog blijven en moet er 3 weken gewacht worden alvorens het loof af te doden. Optimaal tijdstip voor een behandeling met HIMALAYA® is 3-5 weken voor loofdoding.
- Niet toepassen bij temperaturen hoger dan 25°C en niet mengen met andere producten.

Uien (drooggeoopte) (open lucht)

Tegen vroegtijdige spruitvorming.

Toepassingsstadium: 4-5 weken voor het roeien.

Dosis: 3,75 kg/ha, maximaal 1 toepassing.

Veiligheidstermijn: 14 dagen.

Diffirendierende maatregelen: respecteer een minimale bufferzone van 1m met klassieke techniek.

De toepassing dient te gebeuren op het einde van het groeiseizoen, als de uien aan het strijken zijn. Optimaal gebeurt dit op het ogenblik dat de vroegst gestreken uien nog net helemaal groen zijn. Om een goede werking te bekomen, moet het minstens 10 uur droog blijven na de toepassing. HIMALAYA® toepassen op een gezond gewas. HIMALAYA® niet mengen met andere producten.

ANDERE VERMELDINGEN

- De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in functie van de mate van het nagestreefde effect of de gevoeligheid van het gewas. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn voor de oogst te verkorten.

EERSTE-HULPMAATREGELEN

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN: De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID: Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245.245

AANWIJZINGEN VOOR LEGE VERPAKKINGEN EN SPUITOVERSCHOTTEN

De zorgvuldig geleidelijke verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het spuittoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de spuittank worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker worden ingeleverd op een daartoe voorzien inzamelput.

Spuitoverschotten ca.10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandeld perceel volgens de voorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

GARANTIE

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, wanneer het volgens onze gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruikdoeleinden. Daar echter de bewaring, de hantering, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontspannen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en/of voor elke schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport, het hanteren of het gebruik ervan, vande hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product. Bij twijfel of onduidelijkheid over de aangegeven gebruikdoeleinden van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. is het aangewezen vooraf informatie bij ons in te winnen.

MODE D'EMPLOI

HIMALAYA® est un régulateur de croissance qui inhibe la formation des germes des pommes de terre et oignons en cours de stockage.

HIMALAYA® bloque la division cellulaire, mais n'entrave pas le grossissement des cellules.

Pommes de terre (plein air)

Contre la formation des germes.

Stade d'application : formation des tubercules (BBCH 4), 80% des tubercules plus de 25mm (Optimal: tubercules entre 25 et 35mm).

Dose : 5 kg/ha, maximum 1 application.

Délai avant récolte : 35 jours

Mesures anti-dérive : respectez une zone tampon minimale de 1 m avec technique classique.

Remarques :

- Pour une durée de 3-4 mois de stockage selon la variété et les conditions de stockage.
- HIMALAYA® doit être appliqué sur l'ensemble du feuillage, en bon état végétatif (absence de maladies, d'insectes, de stress hydrique).
- Afin de choisir le bon moment pour appliquer l'HIMALAYA®, il faut échantillonner la parcelle de pommes de terre et calibrer les pommes deterre: les tubercules de 25mm de diamètre ou plus, peuvent grossir après l'application. Les tubercules plus petits que 25mm ne peuvent plus grossir après une application avec ce produit. Il faut que minimum 80% des tubercules ait un diamètre de plus que 25mm avant de traiter.
- HIMALAYA® ne doit pas être utilisé sur les pommes de terre utilisées pour la culture de plants.
- Pour garantir une bonne absorption de l'HIMALAYA® dans les plantes, il faut respecter un délai à la pluie de minimum 24 heures après l'application et il ne faut pas défaner le feuillage dans les trois semaines suivant l'application de l'HIMALAYA®. Le temps d'application optimal avec HIMALAYA® est de 3 à 5 semaines avant la défanage.
- Ne pas appliquer l'HIMALAYA® quand il fait plus que 25°C et ne pas mélanger avec des autres produits.

Oignon (récolté sec) (plein air)

Contre la formation des germes.

Stade d'application : 4-5 semaines avant la récolte.

Dose : 3,75 kg/ha, maximum 1 application.

Délai avant récolte : 14 jours

Mesures anti-dérive : respectez une zone tampon minimale de 1m avec technique classique.

L'application d'HIMALAYA® se fait à la fin de la période de croissance des oignons, quand les fanes commencent à tomber. Les premières fanes tombées doivent encore être vertes pour une bonne absorption du produit.

Il faut respecter un délai à la pluie de minimum 10 heures après l'application pour garantir une bonne absorption du produit.

Appliquer l'HIMALAYA® sur une culture saine. Ne pas mélanger HIMALAYA® avec des autres produits.

AUTRES MENTIONS

- La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, en fonction de l'étendue des effets recherchés ou de la sensibilité variétale. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

CONSEILS DE PREMIERS SECOURS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons 070/245.245

EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les eaux de ce nettoyage environ 10 fois et pulvériser celles-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

GARANTIE

Des examens approfondis ont démontré que le produit, si utilisé conformément à nos instructions, convient aux usages recommandés. Toutefois, comme la conservation, la manutention, le transport et l'usage échappent à notre contrôle, et d'autant plus qu'il nous est impossible de prévoir toutes les circonstances, nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus et/ou aux endommagements qui surviendraient suite à la conservation, la manutention, le transport ou l'usage du produit. Nous garantissons uniquement la qualité constante du produit fourni. En cas de doute ou d'incompréhension quant aux utilisations décrites du produit sur des cultures nouvelles et/ou inhabituelles, sur de nouvelles races etc., veuillez nous contacter d'avance afin d'obtenir de plus amples informations.